


Algorithme d'évaluation et de prescription à l'intention des pharmaciens :

La prophylaxie antibiotique visant à prévenir la maladie de Lyme à la suite d'une piqûre de tique



Considérations thérapeutiques :

- La doxycycline devrait être utilisée pour la prophylaxie post-exposition chez les adultes et les enfants de tout âge. Auparavant, la doxycycline n'était pas recommandée pour les enfants de moins de 8 ans, mais cette consigne a changé, car la coloration dentaire est peu fréquente lors de traitements de courte durée^{7,8}.
- Auparavant, la doxycycline était contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes, mais des données récentes ont démontré qu'une dose unique de doxycycline est sans danger pour cette catégorie⁹.
- Si la doxycycline est contre-indiquée (p. ex., allergie), il n'y a pas de solution de rechange. Ne pas prescrire un autre antibiotique pour la prophylaxie post-exposition. Indiquer au patient d'être à l'affût de symptômes pendant 30 jours et de consulter un médecin ou une infirmière praticienne si des symptômes apparaissent.

Bibliographie :

1. Ordre des pharmaciens de l'Ontario. Community Pharmacist Practice Assessment Criteria [en ligne]. Toronto, ON : Ordre des pharmaciens de l'Ontario; 2017 [cité le 3 mars 2023]. Disponible à : <https://www.ocpinfo.com/library/practice-related/download/PracticeAssessmentCriteria.pdf>
2. Santé Ontario. Document d'orientation clinique. Prise en charge des piqûres de tiques et examen de la maladie de Lyme au stade localisé précoce [en ligne]. Toronto, ON : Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2023 [cité le 29 septembre 2023]. Disponible à : <https://www.hqontario.ca/Améliorer-les-soins-grâce-aux-données-proban-tes/Données-proban-tes-et-Qualité-des-services-de-santé-Ontario/Documents-orientation>
3. Santé Canada. Pour les professionnels de la santé : maladie de Lyme [en ligne]. Ottawa, ON : gouvernement du Canada; 2022 [modifié le 22 déc. 2022; cité le 3 mars 2023]. Disponible à : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-sante-maladie-lyme.html>
4. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et coll. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis. 2021;72(1):1-8. Disponible à : <https://academic.oup.com/cid/article/72/1/e1/6010652>

5. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Vector-Borne Diseases (DVBD). Tick Removal [en ligne]. Atlanta, GA : CDC; 2022 [revu le 13 mars 2022; cité le 3 mars 2023] Disponible à : https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html
6. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Carte des zones considérées à risque pour la maladie de Lyme en Ontario, 2022 [en ligne]. Toronto, ON : Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2022. [mis à jour le 15 déc. 2022; cité le 3 mars 2023] Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/vector-borne-zoonotic-diseases/lyme-disease>
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Vector-Borne Diseases (DVBD). Lyme disease prophylaxis after tick bite [en ligne]. Atlanta, GA : CDC; 2022 [revu le 5 août 2022; cité le 3 mars 2023]. Disponible à : <https://www.cdc.gov/ticks/tickbornedis-eases/tick-bite-prophylaxis.html>
8. Viel-Thériault I, Le Saux N. Lyme Disease. Dans : Therapeutics [en ligne]. Ottawa, ON : Association des pharmaciens du Canada; 2021 [cité le 3 mars 2023]. Disponible à : <http://www.myrxtx.ca>.
9. Smith GN, et coll. Committee opinion no. 399 : management of tick bites and Lyme disease during pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2020;42(5):644-53. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2020.01.001>